

**CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA
PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN DE CATÉTER URETERAL DOBLE J**

FECHA ENTREGA FORMULARIO: __/__/____

Nombre del Paciente	
R.U.T del Paciente	

Es muy importante que usted participe en su proceso de atención en salud. Para ello, es nuestro deseo otorgarle las mayores facilidades y resolver sus dudas y consultas.

En este documento usted encontrará información sobre el procedimiento que le ha propuesto su médico tratante, lo que le ayudará a entender mejor la información entregada por él en la consulta. Léala atentamente, si requiere más información o que le sea aclarado algún punto, no dude en solicitarlo a su médico, él estará dispuesto a satisfacer sus requerimientos.

Lo informado verbalmente o, a través, de este documento, responde a lo que se espera que suceda en la generalidad de los casos, en condiciones normales. Debe tener presente que cada paciente es un ser único y distinto, de manera que puede suceder que no siempre se produzcan los resultados esperados y/o deseados. Pueden existir condiciones propias del paciente o del procedimiento que signifiquen mayores riesgos, o bien, influir una serie de factores imposibles de prever que modifiquen los resultados esperados, en condiciones normales.

Una vez informado, es usted quien, debe decidir si desea o no someterse a la intervención propuesta.

INFORMACIÓN SOBRE LA INTERVENCIÓN

Mediante este procedimiento se pretende drenar adecuadamente el riñón mediante la instalación de una sonda (pigtail o doble jota), que se introduce en el uréter del lado afectado, permitiendo el paso de la orina desde el riñón a la vejiga.

Los motivos más frecuentes que llevan a la instalación de un catéter de este tipo son los cálculos ureterales, que pueden asociarse a infecciones urinarias de distinta gravedad, masas que compriman el trayecto ureteral o lesiones ureterales.

Habitualmente el uso de un pigtail se indica de forma transitoria, hasta poder resolver el problema subyacente. En casos particulares su uso puede ser permanente, con necesidad de recambio periódico.

Se debe recalcar que luego de su instalación debe continuar con sus controles periódicos y definir el plan con su tratante. El uso prolongado y no supervisado de estos dispositivos se asocia a mayor riesgo de infecciones urinarias, calcificación del dispositivo, obstrucción ureteral y pérdida del riñón afectado.

La intervención se lleva a cabo en pabellón, bajo sedación o anestesia general o raquídea, que la que será indicada por el anesthesiólogo, con los riesgos y eventuales complicaciones propias de los procedimientos relacionados a ella y es posible que durante o después de la intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados.

La intervención se realiza mediante un procedimiento endoscópico (cistoscopia) en el que se introduce una pequeña cámara por su uretra, llegando a la vejiga, para luego ascender el catéter doble jota por el uréter de los lados comprometidos, hasta llegar y drenar el riñón.

Cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones o en algunos casos la suspensión del procedimiento por los hallazgos intraoperatorios.

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse **efectos indeseables y complicaciones**, tanto las comunes a toda intervención quirúrgica (infección de herida operatoria, hemorragia intra o postoperatoria, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, presencia de hematomas, entre otras) y aquellas complicaciones generales las cuales pueden ser agravadas por las condiciones propias del paciente y patologías

concomitantes (diabetes, cardiopatía, hipertensión, obesidad, etc.), como son infarto al miocardio, accidente cerebrovascular, arritmias intraoperatorias, neumonía, atelectasias, insuficiencia respiratoria, reacciones alérgicas leves o graves a medicamentos u otras, **como otros específicos del procedimiento:**

- No lograr paso del pigtail, sin lograr drenar el riñón afectado. De ser así puede ser necesario colocar, en el mismo acto quirúrgico o en otra intervención, un drenaje directamente desde la pared abdominal hasta su riñón (nefrostomía) y en algunos casos mediante esta misma punción lograr pasar el catéter doble jota desde el riñón hasta su vejiga.
- Infección urinaria o general de consecuencias imprevisibles: puede desarrollarse una infección post cirugía u ocurrir descompensaciones de infecciones ya presentes y contenidas en el riñón obstruido.
- Perforación Ureteral con riesgo de sangrado, infección, reabsorción de líquidos, todas ellas de consecuencias imprevisibles, que pueden precisar nueva intervención o manipulación.
- Desplazamiento del pigtail con necesidad de reposicionamiento y reintervención.
- Calcificación de parte o de todo el trayecto del pigtail, con la necesidad de una o varias cirugías para lograr su extracción.
- Hemorragia, tanto durante el acto como después cuyas consecuencias pueden ser muy diversas dependiendo del tipo de tratamiento que haya de necesitarse.

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros) pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia.

Ningún procedimiento invasivo está exento del riesgo de complicaciones, incluyendo el de mortalidad, si bien esta posibilidad es muy infrecuente para este procedimiento.

Las alternativas son la cirugía abierta y el drenaje percutáneo del riñón, pero que en su caso lo más aconsejable es la colocación de doble J.

En su caso particular el lado a intervenir es el siguiente (marque con una X):

Lado derecho

Lado izquierdo

CONDICIONES PARTICULARES

Usted debe tener presente que los riesgos a los cuales se puede ver expuesto varían entre una persona y otra. Pueden existir condiciones propias (prematurez, estado físico, enfermedades preexistentes, hábitos) que signifiquen mayores riesgos, lo mismo que su forma personal de responder al tratamiento.

Conforme a sus antecedentes, usted presenta los siguientes riesgos: _____

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO

(A llenar de puño y letra por el paciente o su representante legal)

YO _____ por mí mismo/en representación del paciente ya individualizado, declaro que he leído la hoja de información que se me ha entregado sobre el **Procedimiento de Colocación de Catéter Ureteral Doble J** y que la he comprendido, lo mismo que la información que en forma verbal se me ha dado; se me ha permitido realizar preguntas, y se me han aclarado mis dudas, por lo que manifiesto sentirme satisfecho(a) con la información recibida.

DECLARO no haber omitido ni alterado datos sobre mi estado de salud, especialmente, en relación con enfermedades, alergias o riesgos personales.

DECLARO comprender que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar (dejar sin efecto) el consentimiento que ahora presto.

Y EN TALES CONDICIONES, COMPRENDIENDO SU INDICACIÓN Y RIESGOS, CONSIENTO EN QUE SE ME REALICE EL PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN DE CATÉTER URETERAL DOBLE J, por el Dr.(a) _____. **DE IGUAL FORMA AUTORIZO**, en caso de necesidad inminente (que está por suceder prontamente), solicitar la concurrencia de otros profesionales; que se realicen interconsultas a especialistas; exámenes y/o que se me traslade a otras instituciones.

Completar por el Profesional

Firma del Consentimiento:	FECHA: ____/____/____	HORA:
Procedimiento o Intervención Quirúrgica		
Diagnóstico		
Nombre, R.U.T. y Firma Médico		

Completar por el Paciente o Representante Legal

Nombre, R.U.T. y Firma Paciente o Representante Legal si corresponde	
--	--

INFORMACIÓN ENTREGADA POR: _____
 (Llenar sólo en caso que sea diferente a quién realiza el procedimiento)