

**CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA  
CIRUGÍA DE MAMOPLASTIA, IMPLANTES MAMARIOS**

FECHA ENTREGA FORMULARIO: \_\_/\_\_/\_\_

Nombre del Paciente	
R.U.T del Paciente	

Es muy importante que usted participe en su proceso de atención en salud. Para ello, es nuestro deseo otorgarle las mayores facilidades y resolver sus dudas y consultas.

En este documento usted encontrará información sobre el procedimiento que le ha propuesto su médico tratante, lo que le ayudará a entender mejor la información entregada por él en la consulta. Léala atentamente, si requiere más información o que le sea aclarado algún punto, no dude en solicitarlo a su médico, él estará dispuesto a satisfacer sus requerimientos.

Lo informado verbalmente o, a través, de este documento, responde a lo que se espera que suceda en la generalidad de los casos, en condiciones normales. Debe tener presente que cada paciente es un ser único y distinto, de manera que puede suceder que no siempre se produzcan los resultados esperados y/o deseados. Pueden existir condiciones propias del paciente o del procedimiento que signifiquen mayores riesgos, o bien, influir una serie de factores imposibles de prever que modifiquen los resultados esperados, en condiciones normales.

Una vez informado, es usted quien, debe decidir si desea o no someterse a la intervención propuesta.

**INFORMACIÓN SOBRE LA INTERVENCIÓN**

**Cirugía de Mamoplastia, Implantes Mamarios**, mediante este procedimiento se pretende aumentar el tamaño de las mamas por una serie de motivos:

- Para mejorar el contorno corporal de la mujer, la cual por razones personales considera tener un busto demasiado pequeño.
- Para corregir la pérdida de volumen mamario después del embarazo.
- Para simetrizar el tamaño de las mamas en caso que éste sea demasiado notorio.
- Como técnica reconstructiva en determinadas situaciones.
- Se considera también el recambio de implantes ya sea por deseo de cambio en el volumen o por complicaciones asociadas a éstos.

La forma y el tamaño de las mamas previo a la cirugía pueden influir tanto en el tratamiento recomendado como en el resultado final. Si las mamas no tienen el mismo tamaño o forma antes de la cirugía es poco probable que sean completamente simétricas después.

Existen varios tipos de implantes: rellenos de gel de silicona (los más utilizados), rellenos de suero fisiológico, de superficie lisa o texturizada, de forma redonda o anatómica. Deberá discutir con su cirujano Plástico el más adecuado para su caso individual. El aumento de la mama se consigue implantando una prótesis ya sea detrás del tejido mamario o debajo del musculo pectoral. Las incisiones se realizan de forma que las cicatrices resulten lo más ocultas que sea posible, habitualmente por debajo de la mama (surco submamario), alrededor de la areola o en la axila. El método de implantación y la posición de la prótesis dependerán de sus preferencias, su anatomía y la recomendación de su cirujano.

El tipo de anestesia requerida, será la indicada por el anesthesiólogo, con los riesgos y eventuales complicaciones propias de los procedimientos relacionados a ella y es posible que durante o después de la intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados.

Cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones o en algunos casos la suspensión del procedimiento por los hallazgos intraoperatorios.

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse **efectos indeseables y complicaciones**, tanto las comunes a toda intervención quirúrgica (infección de herida operatoria, hemorragia intra o postoperatoria, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, presencia de hematomas, entre otras) y aquellas complicaciones generales las cuales pueden ser agravadas por las condiciones propias del paciente y patologías concomitantes (diabetes, cardiopatía, hipertensión, obesidad, etc.), como son infarto al miocardio, accidente cerebrovascular, arritmias intraoperatorias, neumonía, atelectasias, insuficiencia respiratoria, reacciones alérgicas leves o graves a medicamentos u otras, **como otros específicos del procedimiento:**

- **Hemorragia:** si ocurriera una hemorragia postoperatoria, podría requerir tratamiento de urgencia para drenar la sangre acumulada o, transfusión de sangre. No debe tomar antiinflamatorios o aspirina desde 10 días antes de la cirugía, ya que pueden aumentar el riesgo de sangrado. Anemia, hematomas, Equimosis, Necrosis de áreas de piel.
- **Infección:** si ocurre una infección, puede ser necesario tratamiento adicional, incluyendo antibióticos. También puede ser necesario el retiro de la prótesis.
- **Cambios en la sensibilidad del pezón y la piel:** puede experimentarse un cambio en la sensibilidad de los pezones y piel de las mamas, que en ocasiones puede no recuperarse del todo después de la cirugía.
- **Daños estructuras profundas** (Nervios, vasos sanguíneos, músculos, pulmones, órganos torácicos)
- **Cicatrización cutánea:** todas las cirugías dejan cicatrices. La calidad de estas cicatrices es impredecible. Pueden producirse cicatrizaciones anormales en la piel o tejidos profundos, estas pueden ser inestéticas o de color diferente a la piel circundante. Pueden necesitarse tratamientos adicionales para la cicatrización, incluyendo nuevas cirugías.
- **Retardo en la cicatrización:** la apertura de la herida o la cicatrización retardada son posibles. Algunas zonas pueden no cicatrizar normalmente, y pueden tardar bastante tiempo en curar. Algunas áreas de piel pueden perderse, lo que puede requerir cambios frecuentes de vendaje, o cirugía posterior para eliminar los tejidos no curados. Los fumadores tienen un mayor riesgo de pérdida cutánea y de complicaciones en la cicatrización.
- **Contractura capsular:** el tejido cicatricial que se forma internamente alrededor del implante puede contraerse y hacer que la mama tenga una consistencia más firme y posiblemente dolorosa. Esta es una complicación que se produce en un pequeño porcentaje de los casos y no es posible predecirla. Este proceso se puede presentar tanto a corto como largo plazo. El tratamiento para la contractura capsular puede requerir cirugía, cambio del implante o retirada del mismo.
- **Lactancia:** Generalmente la Mamoplastía con implantes no interfiere en la lactancia futura.
- **Extrusión del implante:** la falta de adecuada cobertura de tejidos o una infección puede dar como resultado la exposición del implante mamario. Si esto ocurre puede ser necesaria la retirada de éste. Otros problemas del implante (ruptura, pliegues, calcificación).
- **Reacciones alérgicas:** en raros casos se han descrito reacciones alérgicas locales al material de sutura o preparados tópicos. Más frecuentemente se pueden producir con las telas utilizadas en los vendajes. Pueden ocurrir reacciones sistémicas más graves frente a medicaciones usadas durante o después de la cirugía. Estas pueden requerir tratamiento adicional.
- **Seroma:** en algunos casos puede suceder una acumulación de líquido alrededor del implante (seroma) en el corto o largo plazo (seroma tardío) que puede causar molestias, requerir estudio o nueva intervención.
- **ALCL:** en los últimos años ha habido reportes en que se ha asociado el desarrollo de Linfoma Anaplástico de Células Grandes (ALCL) a pacientes portadoras de implantes. Aunque su ocurrencia es estadísticamente muy baja en la actualidad (0.0003%) puede ocurrir en mujeres con implantes mamarios, y requerir estudio, nueva intervención u otros tratamientos.

Los pacientes que son fumadores tienen un mayor riesgo de complicaciones quirúrgicas importantes de la piel, retraso en la cicatrización y complicaciones anestésicas. Es recomendable

abstenerse de fumar al menos 6 semanas antes de la cirugía y hasta que su médico lo determine en el post-operatorio. En determinadas circunstancias, claramente definidos por su cirujano plástico, este procedimiento puede ser realizado sobre una persona que fuma. Hay muchas reacciones adversas que se producen como resultado de la toma de medicamentos recetados (vitaminas liposolubles, aspirina y antioxidantes), y a base de hierbas (medicina alternativa, homeopatía).

El resultado a largo plazo va a depender, entre otras cosas, de que el paciente mantenga un estilo de vida saludable que incluye dieta adecuada, ejercicios, no fumar y mantenerse en control con su cirujano tratante. Cambios en la apariencia de su cuerpo, como el envejecimiento, la exposición al sol, la pérdida o aumento de peso, embarazo, menopausia u otras circunstancias no relacionadas con la cirugía, pueden alterar el resultado a largo plazo.

Si bien en la mayoría de los casos, se esperan buenos resultados, no hay ninguna garantía o garantía expresa o implícita, sobre los resultados que pueden obtenerse. Usted puede terminar decepcionado (a) con los resultados de la cirugía, nuevos procedimientos pueden ser necesarios para mejorar esta situación y los costos adicionales que se pueden producir son de exclusiva responsabilidad del paciente.

La información médica actual no demuestra un aumento del riesgo de cáncer de mama en pacientes que se hayan sometido a cirugías de implantes mamarios. Las mujeres con implantes mamarios al igual que todas las mujeres, deben realizar el autoexamen de mama periódico, la mamografía y buscar atención profesional en caso de que se detecte un tumor en su mama. Los implantes mamarios pueden hacer la mamografía más difícil, por lo que es necesario informar al tecnólogo que realiza dicho examen, de la presencia de los implantes mamarios.

Ningún procedimiento invasivo está exento del riesgo de complicaciones, incluyendo el de mortalidad, si bien esta posibilidad es muy infrecuente para este procedimiento.

### CONDICIONES PARTICULARES

Usted debe tener presente que los riesgos a los cuales se puede ver expuesto varían entre una persona y otra. Pueden existir condiciones propias (prematurez, estado físico, enfermedades preexistentes, hábitos) que signifiquen mayores riesgos, lo mismo que su forma personal de responder al tratamiento. Conforme a sus antecedentes, usted presenta los siguientes riesgos: \_\_\_\_\_

### DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO (A llenar de puño y letra por el paciente o su representante legal)

**YO** \_\_\_\_\_ **por mí mismo/en representación del paciente ya individualizado,** declaro que he leído la hoja de información que se me ha entregado sobre **la Cirugía de Mamoplastia, Implantes Mamarios** y que la he comprendido, lo mismo que la información que en forma verbal se me ha dado; se me ha permitido realizar preguntas, y se me han aclarado mis dudas, por lo que manifiesto sentirme satisfecho(a) con la información recibida.

**DECLARO** no haber omitido ni alterado datos sobre mi estado de salud, especialmente, en relación con enfermedades, alergias o riesgos personales.

**DECLARO** comprender que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar (dejar sin efecto) el consentimiento que ahora presto.

**Y EN TALES CONDICIONES, COMPRENDIENDO SU INDICACIÓN Y RIESGOS, CONSIENTO EN QUE SE ME REALICE LA CIRUGÍA DE MAMOPLASTIA, IMPLANTES MAMARIOS,** por el Dr.(a)\_\_\_\_\_. **DE IGUAL FORMA AUTORIZO,** en caso de necesidad inminente (que está por suceder prontamente), solicitar la concurrencia de otros profesionales; que se realicen interconsultas a especialistas; exámenes y/o que se me traslade a otras instituciones.

**Completar por el Profesional**

Firma del Consentimiento:	<b>FECHA:</b> ____/____/____	<b>HORA:</b>
Procedimiento o Intervención Quirúrgica		
Diagnóstico		
Nombre, R.U.T. y Firma Médico		

**Completar por el Paciente o Representante Legal**

Nombre, R.U.T. y Firma Paciente o Representante Legal si corresponde	
--	--

**INFORMACIÓN ENTREGADA POR:** \_\_\_\_\_  
(Llenar sólo en caso que sea diferente a quién realiza el procedimiento)